








ジオトリフを初めて服用される患者様へ

患者氏名

様

患者様用 1 / 2

月/日	/	/	/ ~ /	/
経過	内服開始前日		内服開始 1 日目	内服開始 2~6 日目
達成目標	疾患について理解できる。		お薬の作用・副作用・内服時の注意点等を理解できる。	
治療			本日よりお薬が始まります 	
検査	採血・レントゲンがあります (外来で行います。) 			採血・レントゲンがあります。 
活動 安静度	制限はありません。			
栄養 (食事)	普通食です。 ※疾患により制限食になる場合があります。			
清潔	清拭・シャワー・入浴		※皮膚症状がみられる際は、入浴前に看護師へお知らせください。 	
排泄	制限はありません。			
教育 指導	<ul style="list-style-type: none"> ・薬剤師より、内服方法・副作用・注意点等について説明があります。 ・皮膚のケア方法について、看護師より説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・お薬は起床時（空腹時）に服用します。 ※当院では朝 6 時に看護師がお渡しします。 ※服用から 1 時間は食事を取らないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下痢や口内炎が生じやすい時期です。排泄後は適宜洗浄し、皮膚の清潔を保ちましょう。 ・積極的のうがい等を行い、口腔内の清潔を保ちましょう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・皮膚症状が出やすい時期です。常に皮膚の保湿の保湿を心がけましょう。
説明	入院時まで服用していたお薬があれば、看護師へお知らせください。 (市販のサプリメントも含まれます) 	本日より、毎日看護師が皮膚の状態の確認を行います。 お薬の服用が始まってから、風邪のような症状が見られる際は、医師・看護師へお知らせください。 お薬の副作用の可能性あります。 他、気になる症状がある際はお知らせください。	下痢が頻回にある際は医師・看護師へお知らせください。 必要時下痢止めのお薬をお渡しします。 場合によってはお薬の調整が必要になります。 口内炎がひどい場合は、食事の変更を行います。	頭皮や顔、お腹やふともも等にきびのようなできものや、赤みが見られる際は、医師・看護師へお知らせください。

※入院期間や治療内容は現時点で予測されるものであり、症状・経過によって異なります。

平成29年7月作成 100003 (Ver 0) クリニカルパス委員会承認





公益社団法人昭和会 今給黎総合病院

ジオトリフを初めて服用される患者様へ

患者氏名

様

患者様用 2/2

月/日	/ ~ /	/	/	/
経過	内服開始 8～13 日目	内服開始 14 日目	内服開始 15 日目	内服開始 16 日目
達成目標	退院に向けて、日常生活の注意点を理解できる。			
治療				本日退院です。 
検査		採血・レントゲン・CTがあります 		
活動 安静度	制限はありません。			
栄養 (食事)	普通食です。 ※疾患により制限食になる場合があります。			
清潔	清拭・シャワー・入浴	※皮膚症状がみられる際は、入浴前に看護師へお知らせください。 		
排泄	制限はありません。			
教育 指導	皮膚症状が出やすい時期です。 常に皮膚の保湿を心がけましょう。			内服開始後1ヶ月程度で、手足の爪の周囲が赤く炎症を起こす事があります。 爪の周りに赤く炎症が見られたり、ひび割れがある際は、医師・看護師へ相談しましょう。
説明	頭皮や顔、お腹やふともも等にニキビのようなできものや、赤みがみられる際は、医師・看護師へお知らせください。			副作用と思われる症状があっても、自己判断でお薬を中止せず、医師へ相談をしてください。 

※入院期間や治療内容は現時点で予測されるものであり、症状・経過によって異なります。

平成29年7月作成 100003 (Ver 0) クリニカルパス委員会承認