

胃ESDを受けられる患者様へ

月/日	入院1日目		/	/	/	/	/	/	/				
経過	手術当日(術前)	術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	退院				
達成目標	手術について理解できる		消化管出血の症状がない・腹膜炎の症状がない			栄養摂取ができる・消化管出血の症状がない							
治療	基本的に昼～午後手術を開始します。		術後に創部の観察や、貧血・出血等により内視鏡検査または緊急で止血術を行う場合があります。										
薬剤	入院時はお薬手帳を持参してください。入院時より点滴を開始します。3本の点滴と術後胃薬・止血剤の注射があります。		点滴4本24時間持続点滴です。朝、夕で胃薬の注射があります。午前に止血剤の点滴があります。		点滴4本24時間持続点滴です。胃薬の内服薬が開始されます。		点滴は2本です。		点滴は本日で終了です。		内服は継続です。	内服は継続です。	
検査			終了後レントゲン撮影をして部屋に戻ります。		採血があります 検査		採血があります 検査				採血があります 検査		
活動安静度	手術まで自由ですが、できるだけ病室・病棟でお過ごし下さい。		術後2時間はベッド上安静。(ポータブルトイレ可)その後はトイレ・洗面のみ移動可です。		トイレ・洗面のみ歩行可		病棟内自由		院内自由 				
栄養(食事)	絶食です。昼まで飲水は可です。 		術後2時間経つまで飲水できません。 		飲水のみ可 絶食 		朝～食事開始流動食		3分粥 	5分粥 	7分粥 	全粥 	常食
清潔	体拭きは可能です。 				シャワー浴可 		入浴可 						
排泄			術後2時間後はトイレ可		歩行開始後は制限なし			制限なし					
教育・指導	休薬していた薬剤は術後に医師の指示にて再開します。退院時にお薬の処方があります。												
説明	ご家族1名は必ず院内(病室)で待機してください。終了後に説明があります。			切除した検体の病理結果は1週間ほどかかります。退院後の再診日に結果説明をいたします。								基本的に10時退院です。	
その他	ESD時は眠くなる注射を使用します。		強い腹痛や下血、吐血がある場合はすぐに看護師にお知らせください。										

※入院期間や治療内容は現時点で予測されるもので、症状により変わります。

平成28年8月作成 120018(Ver.1)クリニカルパス委員会承認 2020.4月改訂

