

Pola-BR療法(R 後発品)【1コース目】※

	Day1	Day2	Day3	休業期間終了日
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 【ルートキープ用】</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 ホラミン注5mg 0.5%/1mL … 1管 【ブレドニン注へ更新前にルートを生食でウォッシュアウトしてください】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 *水溶性ブレドニン【20mg】 … 5管 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 リツキシマブ … 375mg/m<sup>2</sup> テルモ生食【500mL】 … 1袋 ★開始0～30分 50mL/時間 30～60分 100mL/時間 60～90分 150mL/時間 90～120分 200mL/時間 120～150分 250mL/時間 150～180分 300mL/時間 180～210分 350mL/時間 210分～ 400mL/時間★</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 【ルートキープ用】</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 (20mL) … 1管 *水溶性ブレドニン【20mg】 … 5管</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 オンタンセトロン注射液4mg「サント」2mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%/1mL … 1管 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 ホラビ … 1.8mg/kg 大塚蒸留水 (20ml) … 1管 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 ★濃度に注意(希釈後0.72mg/mLから2.70mg/mLになるように調整)★ ★インラインフィルタ(0.2又は0.22μ m)を使用すること★ ★開始～5分 15mL/時間 5分～ 35mL/時間★</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間30分 【ホラビによるIR無いか経過観察】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 トリアキシ注 … 90mg/m<sup>2</sup> 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間10分</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 【ルートキープ用】</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 (20mL) … 1管 *水溶性ブレドニン【20mg】 … 5管</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 オンタンセトロン注射液4mg「サント」2mL … 1管 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 トリアキシ注 … 90mg/m<sup>2</sup> 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間10分</p>	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>加ナール錠【300mg】 … 1回 1錠 (1日 1錠) 1日1回 【リツキシマブ投与30分前】</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>加ナール錠【300mg】 … 1回 1錠 (1日 1錠) 1日1回 【ホラビ-投与30分前に内服】</p>		

Pola-BR療法(R 後発品)【2-3日目以降】※

	Day1	Day2	Day21	休業期間終了日
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 【ルートキープ用】</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 ホラミン注5mg 0.5%/1mL … 1管 【ブレドニン注へ更新前にルートを生食でウォッシュアウトしてください】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 *水溶性ブレドニン【20mg】 … 5管 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 リツキシマブ … 375mg/m<sup>2</sup> テルモ生食【500mL】 … 1袋 ★開始0～30分 100mL/時間 30～60分 200mL/時間 60～90分 300mL/時間 90分～ 400mL/時間★</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 オンタンセトロン注射液4mg「サント」2mL … 1管 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 ホラビ … 1.8mg/kg 大塚蒸留水 (20ml) … 1管 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 ★濃度に注意(希釈後0.72mg/mLから2.7mg/mLになるように調整)★ ★インラインフィルタ(0.2又は0.22μ m)を使用すること★ ★開始～5分 45mL/時間 5分～ 100mL/時間★</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間30分 【ホラビによるIR無いか経過観察】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 トリアキシ注 … 90mg/m<sup>2</sup> 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間10分</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 【ルートキープ用】</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 (20mL) … 1管 *水溶性ブレドニン【20mg】 … 5管</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 (100mL) … 1瓶 オンタンセトロン注射液4mg「サント」2mL … 1管 所要時間:0時間30分</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 トリアキシ注 … 90mg/m<sup>2</sup> 大塚生食注 【50mL】 … 1瓶 所要時間:0時間10分</p>		
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>加ナール錠【300mg】 … 1回 1錠 (1日 1錠) 1日1回 【リツキシマブ投与30分前】</p>			